CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN MATURALNY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

MATEMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY

FORMUŁA OD 2015

(„NOWA MATURA”)

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

ARKUSZ MMA-P1A1P-203

CZERWIEC 2020

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających uczciwie i z zaangażowaniem.
- **Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny**. Pamiętaj, że każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki określone w poleceniu, musi zostać pozytywnie oceniona, nawet jeżeli nie została przewidziana w przykładowych odpowiedziach w zasadach oceniania.
- Konsultuj niejednoznaczne rozwiązania zadań z innymi egzaminatorami lub przewodniczącym zespołu egzaminatorów. W przypadku niemożności osiągnięcia wspólnego stanowiska, rozstrzygajcie na korzyść zdającego.
- Przyznając punkty, nie kieruj się emocjami.
- Informuj przewodniczącego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie oceniania, w tym podejrzeń o niesamodzielność w pisaniu pracy.

Wersja A

Nr zad.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Odp.	C	B	C	D	A	B	C	A	D	A	B	B	D	B	D	A	B	D	A	C	D	D	C	B	B

Zadanie 1. (0–1)

Zadanie 2. (0–1)

Zadanie 3. (0–1)

Zadanie 4. (0–1)

Zadanie 5. (0–1)

Zadanie 6. (0–1)

Zadanie 7. (0–1)

Zadanie 8. (0–1)

Zadanie 9. (0–1)

Zadanie 10. (0–1)

Zadanie 11. (0–1)

Zadanie 12. (0–1)

Zadanie 13. (0–1)

Zadanie 14. (0–1)

Zadanie 15. (0–1)

Zadanie 16. (0–1)

Zadanie 17. (0–1)

Zadanie 18. (0–1)

Zadanie 19. (0–1)

Zadanie 20. (0–1)

Zadanie 21. (0–1)

Zadanie 22. (0–1)

Zadanie 23. (0–1)

Zadanie 24. (0–1)

Zadanie 25. (0–1)

Zadanie 26. (0–2)

Rozwiąż nierówność $(2x+5)(3x-1)\geq 0$.

Zadanie 26. (0–2)

Rozwiązanie

Rozwiązanie nierówności kwadratowej składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap rozwiązania polega na wyznaczeniu pierwiastków trójmianu kwadratowego $(2x+5)(3x-1)$.

Znajdujemy pierwiastki trójmianu kwadratowego $6x^2+13x-5$:


- podajemy je bezpośrednio z postaci iloczynowej: $x_1=-\frac{5}{2}$, $x_2=\frac{1}{3}$

albo

- obliczamy wyróżnik tego trójmianu, a następnie stosujemy wzory na pierwiastki: $\Delta=13^2-4\cdot 6\cdot(-5)=289$, $\sqrt{\Delta}=17$, $x_1=\frac{-13-17}{12}=-\frac{5}{2}$, $x_2=\frac{-13+17}{12}=\frac{1}{3}$.

Drugi etap rozwiązania polega na wyznaczeniu zbioru rozwiązań nierówności $(2x+5)(3x-1)\geq 0$.

Podajemy zbiór rozwiązań nierówności: $\left(-\infty,-\frac{5}{2}\right\rangle\cup\left\langle\frac{1}{3},+\infty\right)$ lub $x\in\left(-\infty,-\frac{5}{2}\right\rangle\cup\left\langle\frac{1}{3},+\infty\right)$ lub ($x\leq-\frac{5}{2}$ lub $x\geq\frac{1}{3}$), np. odczytując go ze szkicu wykresu funkcji $f(x)=6x^2+13x-5$.



Schemat oceniania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.

gdy:

- zrealizuje pierwszy etap rozwiązania i na tym zakończy lub błędnie zapisze zbiór rozwiązań nierówności, np.
  - obliczy lub poda pierwiastki trójmianu kwadratowego $x_1 = -\frac{5}{2}$, $x_2 = \frac{1}{3}$ i na tym zakończy lub błędnie zapisze zbiór rozwiązań nierówności,
  - zaznaczy na wykresie miejsca zerowe funkcji $f(x) = 6x^2 + 13x - 5$ i na tym zakończy lub błędnie zapisze zbiór rozwiązań nierówności

albo

- realizując pierwszy etap błędnie wyznaczy pierwiastki (ale otrzyma dwa różne pierwiastki) i konsekwentnie do tego rozwiąże nierówność, np. popełni błąd rachunkowy przy obliczaniu wyróżnika lub pierwiastków trójmianu kwadratowego i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże nierówność.


Zdający otrzymuje ..... 2 p.

gdy:

- poda zbiór rozwiązań nierówności: $\left(-\infty, -\frac{5}{2}\right\rangle \cup \left\langle \frac{1}{3}, +\infty\right)$ lub $x \in \left(-\infty, -\frac{5}{2}\right\rangle \cup \left\langle \frac{1}{3}, +\infty\right)$ lub ($x \leq -\frac{5}{2}$ lub $x \geq \frac{1}{3}$)

albo

- poda zbiór rozwiązań nierówności w postaci graficznej z poprawnie zaznaczonymi końcami przedziałów



Uwagi

1. Jeżeli zdający popełnia błąd w przepisywaniu nierówności, np. zapisze $(2x-5)(3x-1) \geq 0$, to może otrzymać **1 punkt**, jeśli konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca.
2. Jeżeli zdający rozwiązuje układ nierówności $2x+5 \geq 0$ i $3x-1 \geq 0$ i nie rozpatruje układu $2x+5 \leq 0$ i $3x-1 \leq 0$, to może otrzymać **1 punkt** za poprawne wyznaczenie pierwiastków $-\frac{5}{2}$ i $\frac{1}{3}$.
3. Zapisanie przedziału domkniętego w nieskończoności traktujemy jako usterkę nie powodującą utraty punktów.

Kryteria oceniania uwzględniające specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

1. Akceptujemy sytuację, gdy zdający poprawnie obliczy lub poda pierwiastki trójmianu $x_1 = -\frac{5}{2}$ i $x_2 = \frac{1}{3}$ i zapisze, np., $x \in \left(-\infty, -\frac{5}{2}\right\rangle \cup \left\langle -\frac{1}{3}, +\infty\right)$ popełniając tym samym błędy przy przepisywaniu pierwiastków, to za takie rozwiązanie otrzymuje **2 punkty**.
2. Jeśli zdający pomyli porządek liczb na osi liczbowej, np. zapisze zbiór rozwiązań nierówności w postaci $x \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right\rangle \cup \left\langle -\frac{5}{2}, +\infty\right)$, to przyznajemy **2 punkty**.

Zadanie 27. (0–2)

Dane są liczby $a = 3\log_2 12 - \log_2 27$ i $b = \left(\sqrt{6} - \sqrt{7}\right)\left(3\sqrt{6} + 3\sqrt{7}\right)$. Wartością $a - b$ jest liczba całkowita. Oblicz tę liczbę.

Zadanie 27. (0–2)

Rozwiązanie

Korzystając z własności działań na logarytmach otrzymujemy
$a = 3\log_2 12 - \log_2 27 = 3\log_2 12 - 3\log_2 3 = 3(\log_2 12 - \log_2 3) = 3\log_2 4 = 6$.
Wykorzystując wzór skróconego mnożenia obliczamy liczbę b
$b = \left(\sqrt{6} - \sqrt{7}\right)\left(3\sqrt{6} + 3\sqrt{7}\right) = 3\left(\sqrt{6} - \sqrt{7}\right)\left(\sqrt{6} + \sqrt{7}\right) = 3 \cdot (-1) = -3$.
A zatem liczba a jest większa od liczby b o 9.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy obliczy liczbę $a = 6$ albo liczbę $b = -3$ i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy poda, że liczba a jest większa od liczby b o 9.

Zadanie 28. (0–2)

Wykaż, że jeśli liczby rzeczywiste a i b spełniają warunek $a<4$ i $b<4$, to $ab+16>4a+4b$.

Zadanie 28. (0–2)

Rozwiązanie zadania

Nierówność $ab+16>4a+4b$ możemy zapisać w postaci równoważnej

$$ab-4a-4b+16>0,$$
$$a(b-4)-4(b-4)>0,$$
$$(a-4)(b-4)>0.$$

Ta nierówność jest prawdziwa, gdyż liczby $a-4$ i $b-4$ są ujemne, co z kolei wynika z założenia $a<4$ i $b<4$, zaś iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią.
To kończy dowód.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy przekształci nierówność $ab+16>4a+4b$ do postaci iloczynowej np. $(a-4)(b-4)>0$ i na tym zakończy lub dalej popełnia błędy.


Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy przeprowadzi pełne rozumowanie.

Uwaga

Jeżeli zdający sprawdza prawdziwość nierówności jedynie dla wybranych wartości a i b, to otrzymuje **0 punktów** za całe rozwiązanie.

Zadanie 29. (0–2)

Bok *AB* jest średnicą, a punkt *S* jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie *ABC*. Punkt *D* leży na tym okręgu, a prosta *SD* jest symetralną boku *BC* trójkąta (zobacz rysunek).



Wykaż, że odcinek *AD* jest zawarty w dwusiecznej kąta *CAB*.


Zadanie 29. (0–2)

Rozwiązanie (I sposób)

Punkt *D* leży na symetralnej odcinka *BC*, zatem odcinki *DC* i *DB* mają równe długości. Stąd wynika, że łuki *DC* i *DB* mają równe długości. Kąty *CAD* i *BAD* są kątami wpisanymi w okrąg, opartymi na łukach równej długości. Zatem kąty te mają równe miary, czyli odcinek *AD* jest zawarty w dwusiecznej kąta *CAB*.

Rozwiązanie (II sposób)

Bok *AB* trójkąta jest średnicą okręgu, zatem trójkąt *ABC* jest prostokątny, a kąt *BCA* jest prosty. Oznaczmy przez *K* punkt przecięcia odcinków *SD* i *BC*.



Kąt *BKS* jest prosty, jako kąt wyznaczony przez symetralną odcinka *BC*. Kąt *CBA* jest wspólnym kątem wewnętrznym trójkątów *ABC* i *SBK*. Jako trójkąty prostokątne, mające wspólny kąt wewnętrzny, trójkąty *ABC* i *SBK* są trójkątami podobnymi.

Zatem kąt *BSK* ma miarę α. Stąd wynika, że kąt rozwarty *ASK* ma miarę $180^\circ - \alpha$.


Kąt *DAS*, jako jeden z dwóch równych kątów w trójkącie równoramiennym *ADS*, ma miarę

$$\frac{180^\circ-(180^\circ-\alpha)}{2}=\frac{\alpha}{2}.$$

Zatem kąt *DAS* stanowi połowę kąta *CAB,* czyli odcinek *AD* jest dwusieczną kata *CAB.*

Rozwiązanie (III sposób)

Niech $\alpha=|\sphericalangle BAD|$ i $\beta=|\sphericalangle CAD|$. Oznaczmy przez *E* punkt przecięcia odcinków *AD* i *BC*.



Trójkąt *ASD* jest równoramienny, więc $|\sphericalangle SAD|=|\sphericalangle SDA|=\alpha$.

Bok *AB* trójkąta *ABC* jest średnicą okręgu opisanego na tym trójkącie, zatem trójkąt *ABC* jest prostokątny, a kąt *ACB* jest prosty. Wobec tego proste *AC* i *SD* są równoległe.Stąd z kolei wynika, że kąty naprzemianległe *SDA* i *CAD* są równe, czyli $\alpha=\beta$. To kończy dowód,

Schemat oceniania I, II i III sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.,
gdy

- skorzysta z faktu, że symetralna jest zbiorem punktów równoodległych od końców odcinka, którego jest symetralną i zapisze, że łuki *BD* i *CD* mają taką samą długość

albo

- uzasadni, że kąty *ABC* i *BSD* mają tę samą miarę

albo

- uzasadni, że proste *AC* i *SD* są równoległe

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.,
gdy przeprowadzi pełne rozumowanie.

Zadanie 30. (0–2)

Dany jest trzywyrazowy ciąg $(x+2, 4x+2, x+11)$. Oblicz te wszystkie wartości *x*, dla których ciąg ten jest geometryczny.

Zadanie 30. (0–2)

Rozwiązanie (I sposób)

Z własności ciągu geometrycznego otrzymujemy równanie

$$(4x+2)^2 = (x+2)(x+11),$$
$$16x^2+16x+4 = x^2+13x+22,$$
$$15x^2+3x-18 = 0,$$
$$5x^2+x-6 = 0,$$
$$(x-1)(5x+6) = 0,$$
$$x=1 \text{ lub } x=-\frac{6}{5}.$$

Dla $x=1$ otrzymujemy ciąg $(3,6,12)$ geometryczny o ilorazie 2, zaś dla $x=-\frac{6}{5}$ otrzymujemy ciąg $\left(\frac{4}{5}, -\frac{14}{5}, \frac{49}{5}\right)$ geometryczny o ilorazie $-\frac{7}{2}$.

Odp. Dla $x=1$ oraz dla $x=-\frac{6}{5}$ otrzymujemy ciąg geometryczny.

Rozwiązanie (II sposób)

Niech *q* oznacza iloraz ciągu geometrycznego. Wtedy ze wzoru na *n*-ty wyraz ciągu geometrycznego otrzymujemy układ równań

$$4x+2 = (x+2)q \text{ i } x+11 = (x+2)q^2.$$

Zauważmy, że dla $x=-2$ otrzymujemy ciąg $(0,-6,9)$, który nie jest geometryczny. Zatem $x \neq -2$. Wtedy mamy

$$q = \frac{4x+2}{x+2} \text{ i } x+11 = (x+2)\cdot\left(\frac{4x+2}{x+2}\right)^2$$

Stąd

$$x+11 = \frac{(4x+2)^2}{x+2},$$
$$(x+2)(x+11) = (4x+2)^2,$$
$$16x^2+16x+4 = x^2+13x+22,$$
$$15x^2+3x-18 = 0,$$
$$5x^2+x-6 = 0,$$
$$(x-1)(5x+6) = 0,$$
$$x=1 \text{ lub } x=-\frac{6}{5}.$$

Dla $x=1$ otrzymujemy ciąg $(3,6,12)$ geometryczny o ilorazie 2, zaś dla $x=-\frac{6}{5}$ otrzymujemy ciąg $\left(\frac{4}{5}, -\frac{14}{5}, \frac{49}{5}\right)$ geometryczny o ilorazie $-\frac{7}{2}$.

Odp. Dla $x=1$ oraz dla $x=-\frac{6}{5}$ otrzymujemy ciąg geometryczny.

Schemat oceniania rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.
gdy zapisze

- równanie z niewiadomą *x* wynikające z własności ciągu geometrycznego, np.: $(4x+2)^2=(x+2)(x+11)$

albo

- układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi, z których jedną z niewiadomych jest *x*, np.: $4x+2=(x+2)q$ i $x+11=(x+2)q^2$.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.
gdy obliczy wszystkie wartości *x*: $x=1$, $x=-\frac{6}{5}$.

Uwagi

1. Jeżeli zdający odgadnie jedną z szukanych wartości $x=1$ i zapisze dla tej wartości ciąg geometryczny $(3,6,12)$, to otrzymuje **1 punkt**.
2. Jeśli zdający zapisze warunek w postaci ilorazowej, ale nie zapisze warunków $x\neq -2$, $x\neq -\frac{1}{2}$ i rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje **2 punkty**.

Zadanie 31. (0–2)

Prosta *k* jest nachylona do osi *Ox* pod kątem ostrym α, takim, że $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$. Wyznacz współczynnik kierunkowy tej prostej.

Rozwiązanie
Współczynnik kierunkowy prostej jest równy tangensowi kąta α nachylenia prostej *k* do osi *Ox*.

Korzystamy z jedynki trygonometrycznej i wyznaczamy $\sin\alpha$.

$$\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$$

$$\sin^2\alpha=\frac{2}{3}$$

$$\sin\alpha=\frac{\sqrt{6}}{3} \text{ lub } \sin\alpha=-\frac{\sqrt{6}}{3}$$

Ponieważ z założenia α jest kątem ostrym, więc $\sin\alpha=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Zatem $\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sqrt{6}}{3}\cdot\left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right)=\sqrt{2}$.

Współczynnik kierunkowy prostej *k* jest równy $\sqrt{2}$.

Schemat oceniania

Zdający otrzymuje ..... 1 p.

gdy wyznaczy $\sin\alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$ i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy.

Zdający otrzymuje ..... 2 p.

gdy wyznaczy współczynnik kierunkowy prostej *k*: $\left(\sqrt{2}\right)$.

Uwaga


Akceptujemy rozwiązania na przybliżeniach.

Zadanie 31. (0–2)

Zadanie 32. (0–4)

Punkty $A=(1,-1)$, $B=(6,1)$, $C=(7,5)$ i $D=(2,4)$ są wierzchołkami czworokąta *ABCD*. Oblicz współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego czworokąta.

Rozwiązanie



Niech *M* oznacza punkt przecięcia przekątnych czworokąta *ABCD*.
Współczynnik kierunkowy prostej *BD* jest równy

$$a_{BD}=\frac{4-1}{2-6}=-\frac{3}{4}\ .$$

Punkt *D* należy do prostej *BD* o równaniu $y=-\frac{3}{4}x+b$.

Zatem $4=-\frac{3}{4}\cdot 2+b$.

Czyli $b=\frac{11}{2}$.

Prosta *BD* ma równanie:

$$y=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{2}\ .$$

Współczynnik kierunkowy prostej *AC* jest równy

$$a_{AC}=\frac{5+1}{7-1}=1.$$

Punkt *A* należy do prostej *AC* o równaniu $y=x+b$.

Zatem $-1=1+b$.
Czyli $b=-2$.
Prosta *AC* ma równanie:

$$y=x-2.$$

Punkt *M* jest punktem przecięcia prostych *AC* i *BD*, więc jego współrzędne obliczymy, rozwiązując układ równań

$$y=x-2 \text{ i } y=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{2}.$$

Stąd otrzymujemy

$$x-2=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{2},$$
$$\frac{7}{4}x=\frac{15}{2},$$
$$x=\frac{30}{7}=4\frac{2}{7}.$$

Zatem $y=4\frac{2}{7}-2=2\frac{2}{7}$, czyli $M=\left(4\frac{2}{7},2\frac{2}{7}\right)$.

Schemat oceniania
Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.
Zdający

- obliczy lub poda współczynnik kierunkowy prostej *BD*: $a=-\frac{3}{4}$

albo

- obliczy lub poda współczynnik kierunkowy prostej *AC*: $a_1=1$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.
Zdający

- zapisze równanie prostej *BD*, np.: $y=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{2}$

albo

- zapisze równanie prostej *AC*, np.: $y=x-2$

i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.
Zdający zapisze równanie prostej *BD* i równanie prostej *AC*, np..:

$$y=x-2 \text{ i } y=-\frac{3}{4}x+\frac{11}{2}.$$

Rozwiązanie pełne ..... 4 p.
Zdający obliczy współrzędne punktu przecięcia przekątnych czworokąta: $M=\left(4\frac{2}{7},2\frac{2}{7}\right)$.

Uwaga
Jeżeli zdający realizuje strategię rozwiązania i popełnia jedynie błędy rachunkowe, to może otrzymać **3 punkty**, o ile popełnione błędy nie ułatwiają rozważanego zagadnienia na żadnym etapie rozwiązania.

Zadanie 32. (0–4)

Zadanie 33. (0–4)

Rzucamy 4 razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia *A*, polegającego na tym, że liczba otrzymanych orłów będzie różna od liczby otrzymanych reszek.

Rozwiązanie

Sposób I

Zdarzeniami elementarnymi są wszystkie czterowyrazowe ciągi utworzone ze zbioru dwuelementowego.

$$\Omega = \{(o,o,o,o),(r,o,o,o),(o,r,o,o),(o,o,r,o),$$
$$(o,o,o,r),(r,r,o,o),(r,o,r,o),(r,o,o,r),$$
$$(o,r,r,o),(o,r,o,r),(o,o,r,r),(r,r,r,o),$$
$$(r,r,o,r),(r,o,r,r),(o,r,r,r),(r,r,r,r)\}$$

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa 16.

Zdarzeniu *A* sprzyjają następujące zdarzenia elementarne:

$$(o,o,o,o),(r,o,o,o),(o,r,o,o),(o,o,r,o),(o,o,o,r),$$
$$(r,r,r,o),(r,r,o,r),(r,o,r,r),(o,r,r,r),(r,r,r,r)$$

Zatem $|A| = 10$ i stąd $P(A) = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$.

Sposób II

Zdarzeniami elementarnymi są wszystkie czterowyrazowe ciągi utworzone ze zbioru dwuelementowego.

$$\Omega = \{(o,o,o,o),(r,o,o,o),(o,r,o,o),(o,o,r,o),$$
$$(o,o,o,r),(r,r,o,o),(r,o,r,o),(r,o,o,r),$$
$$(o,r,r,o),(o,r,o,r),(o,o,r,r),(r,r,r,o),$$
$$(r,r,o,r),(r,o,r,r),(o,r,r,r),(r,r,r,r)\}$$

Liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa 16.

Zdarzenie *A'* polega na wyrzuceniu tej samej liczby orłów i reszek, zatem sprzyjają mu następujące zdarzenia elementarne:
$(o,o,r,r),(r,r,o,o),(o,r,o,r),(r,o,r,o),(r,o,o,r),(o,r,r,o)$.

Zatem $|A'|=10$ i stąd $P(A)=1-P(A')=1-\frac{6}{16}=\frac{5}{8}$.

Uwaga
Zbiory: Ω, A i A' mogą być zapisane za pomocą drzewa.

Schemat oceniania
Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.
Zdający

- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych $|\Omega|=16$
  albo
- narysuje pełne drzewo z 16 gałęziami
  albo
- wypisze wszystkie zdarzenia elementarne lub wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu *A* lub wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu *A'*
  albo

i na tym zakończy lub dalej popełnia błędy.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.
Zdający

- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych $|\Omega|=16$ oraz obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych w których liczba orłów jest większa od liczby reszek

  albo
- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych $|\Omega|=16$ oraz obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych w których liczba orłów jest mniejsza od liczby reszek
  albo
- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych, w których liczba orłów jest różna od liczby reszek $|A|=10$
  albo
- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych oraz liczbę zdarzeń sprzyjających zdarzeniu przeciwnemu ($|\Omega|=16$, $|A'|=6$)
  albo
- zaznaczy na drzewie 10 gałęzi ilustrujących zdarzenie *A* lub 6 gałęzi ilustrujących zdarzenie *A'*.

i na tym zakończy lub dalej popełnia błędy.
Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.

- Zdający obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych $|\Omega|=16$ oraz obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych, w których liczba orłów jest różna od liczby reszek $|A|=10$
  albo

- zaznaczy na drzewie 10 gałęzi ilustrujących zdarzenie A lub 6 gałęzi ilustrujących zdarzenie przeciwne oraz na co najmniej jednej gałęzi każdego etapu zaznaczy prawdopodobieństwo $\frac{1}{2}$

  albo
- obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego $P(A') = \frac{3}{8}$

Rozwiązanie pełne ..... 4 p.

Zdający obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia A: $P(A) = \frac{5}{8}$.

Uwagi

1. Jeżeli zdający pomija przypadki (*o*, *o*, *o*, *o*) lub (*r*, *r*, *r*, *r*), to może otrzymać co najwyżej **2 punkty**.
2. Jeżeli zdający obliczy $|\Omega| = 16$ i pominie jedno zdarzenie elementarne sprzyjające zdarzeniu A i nie wypisze niepoprawnego zdarzenia oraz rozwiąże zadanie do końca, to może otrzymać co najwyżej **2 punkty**.
3. Jeżeli zdający zapisze tylko $|\Omega| = 16$, $|A| = 10$, $P(A) = \frac{5}{8}$ bez uzasadnienia, to otrzymuje **1 punkt**.


Zadanie 33. (0–4)

Zadanie 34. (0–5)

W ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, którego krawędź podstawy ma długość 8, ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy po kątem $\alpha = 60°$. Oblicz cosinus kąta między krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa.

Zadanie 34. (0–5)

Rozwiązanie
Wprowadzamy oznaczenia jak na rysunku.



Odcinek PR jest wysokością trójkąta równobocznego o boku $a=8$, zatem
$|PR|=\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{8\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$.
Z trójkąta prostokątnego SPR, w którym kąty mają miary $90°$, $60°$, $30°$, obliczamy długość odcinka SR, np. $\frac{|PR|}{|SR|}=\cos 60°$. Zatem $|SR|=8\sqrt{3}$.
Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta SRB, który jest prostokątny, obliczamy długość krawędzi bocznej.

$$|SB|^2=|SR|^2+|RB|^2$$
$$|SB|^2=\left(8\sqrt{3}\right)^2+4^2$$
$$|SB|^2=192+16$$
$$|SB|^2=208$$

Zatem $|SB|=\sqrt{208}=4\sqrt{13}$
Z trójkąta SPB, który jest prostokątny, otrzymujemy $\cos\beta=\frac{|BP|}{|SB|}=\frac{8}{4\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

Schemat oceniania
Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania ..... 1 p.
Zdający

- prawidłowo zaznaczy na rysunku kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy

albo

- obliczy długość odcinka $|PR| = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp ..... 2 p.
Zdający

- obliczy wysokość ściany bocznej (długość odcinka SR, np. $\frac{|PR|}{|SR|} = \cos 60°$):

  $|SR| = 8\sqrt{3}$

albo

- obliczy wysokość ostrosłupa (długość odcinka SP, np. $\frac{|SP|}{|RP|} = \text{tg}60°$): $|SP| = 12$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

Pokonanie zasadniczych trudności zadania ..... 3 p.
Zdający

- obliczy długość krawędzi bocznej ostrosłupa $|SB| = \sqrt{208} = 4\sqrt{13}$

albo

- zapisze, że $\text{tg}\beta = \frac{\sqrt{1-\cos^2\beta}}{\cos\beta}$, gdzie β jest kątem między krawędzią boczną i płaszczyzną podstawy

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

Zdający obliczy długość krawędzi bocznej ostrosłupa $|SB| = \sqrt{208} = 4\sqrt{13}$.

Rozwiązanie pełne, ale z usterkami ..... 4 p.
Rozwiązanie pełne ..... 5 p
Zdający

- zaznaczy kąt między krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy i obliczy cosinus tego kąta $\cos\beta = \frac{2\sqrt{13}}{13}$

albo

- prawidłowo opisze stosunek odpowiednich boków w trójkącie ΔSPB, $\cos\beta = \frac{|BP|}{|SB|} = \frac{8}{4\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}$.

Uwaga
Jeżeli uczeń rozważa graniastosłup lub w ostrosłupie błędnie interpretuje kąty otrzymuje **0 punktów.**